

LIEVRE

Comptages 2025-2026 : beaux résultats, l'Indice Kilométrique est en progression



Le lièvre est une espèce présente sur les pelouses d'altitude jusqu'aux plaines cultivées du Lauragais.

Gibier de prédilection de nombreux chasseurs, il bénéficie d'un suivi de près par les gestionnaires pendant et en dehors des périodes de chasse.

En complément, le projet Cyn'obs, soutenu par l'OFB et la FNC, aide à approfondir les connaissances sur cette espèce.

Le lièvre fait l'objet de quelques prélèvements souvent maîtrisés

par des plans de gestion mis en place localement.

Ce petit mammifère de la famille des léporidés, suscite une attention particulière car les conditions météorologiques en période de reproduction, la sensibilité aux maladies et la dégradation de ses habitats, peuvent lui être néfastes.

Cet hiver, malgré les conditions pluvieuses difficiles, notamment en janvier 2026, les comptages ont pu se faire à 99% au cœur des territoires.



Indice départemental


Le graphique ci-dessous traduit l'évolution quantitative des observations de lièvres sur les 10 dernières années en Haute-Garonne.

Durant cette décennie, l'indice kilométrique d'abondance (IKA) fluctue autour de 1- 1,10 lièvre observé au kilomètre. Notons que cette année, avec plus de 2200 km parcourus et 2835 lièvres observés, cet indice atteint 1.28 lièvre au km de moyenne départementale. Après une stabilité de l'IK sur les 3 dernières années, la valeur est nettement en progression cet hiver.

La surveillance de la reproduction et de la présence de maladies, permettent d'adapter la pression de chasse et de définir les règles de gestion des prélèvements appliquées par les gestionnaires. Notons que quelques cas de strongylose pulmonaire disséminés dans le département ont été rapportés par les chasseurs pendant la saison.

Les tendances d'évolution ne sont pas uniformes dans tous les pays cynégétiques, comme le montrent les graphes ci-après.


Evolution Indice Kilométrique Abondance
du lièvre en Haute-Garonne



Les résultats par pays cynégétique



Evolution Indice Kilométrique Abondance
Pays Toulousain



Le **Pays Toulousain** a la particularité d'être un secteur très urbanisé dans lequel le lièvre a su conserver sa place.


L'indice kilométrique, bien que fluctuant, nous informe que la population semble croître avec un niveau correct d'un IKA moyen autour de 1. Après une belle progression l'an dernier avec un indice à 1.19, la valeur est redescendue à 1 cet hiver. Cette valeur témoigne que le lièvre réussit à s'adapter à un milieu urbanisé qui paraît peu propice à sa présence mais dont les habitats agricoles relictuels (grandes cultures entrecoupées de bosquets et de quelques haies) semblent finalement lui convenir.

C'est dans le **Pays Lauragais** que les densités de lièvres sont toujours les plus élevées du département, en raison d'habitats favorables.


Le lièvre est le gibier de prédilection dans cette région. Après une longue période de diminution jusqu'en 2016-2017, la situation ne cesse de s'améliorer.

Cette année l'indice de 2.34 confirme le maintien d'un IKA à un niveau souhaité. C'est le 2e meilleur indice des 30 dernières années ! La gestion cynégétique des dernières saisons a permis de réhausser les populations à un très bon niveau. Il sera primordial de poursuivre ces adaptations de pression de chasse afin d'éviter des impacts sur les cultures.

Evolution Indice Kilométrique Abondance
Pays Lauragais



Evolution Indice Kilométrique Abondance
Pays Coteaux du Gers et de Gascogne



Les populations de lièvres dans les **coteaux du Gers et de Gascogne**, étaient très fluctuantes depuis plusieurs années. Sur la saison 2021-2022, l'IKA était tombé à 0.63, niveau le plus faible jamais enregistré dans ce pays.


Le comptage de cet hiver montre que ce pays retrouve des valeurs dignes de son territoire et de ses milieux, avec 1,17 animaux vus au km parcouru, soit le double d'il y a 5 ans !

Notons que les populations de lièvres sont dépendantes de la chasse mais aussi des modifications des façons culturales (extension des surfaces de fauche). A cela s'ajoute la présence du renard qui pullule dans ce secteur, de 015 à 0.42 renard au km.

Les résultats par pays cynégétique



Evolution Indice Kilométrique Abondance
Pays Volvestre



Dans le **Pays Volvestre**, l'indice fluctue à un niveau autour de 1.

Après une valeur relevée autour de 1.10 pendant plusieurs années, les chiffres enregistrés depuis 2 ans, indiquaient que l'amélioration des populations était engagée. Passé la belle envolée de l'an dernier, l'indice revient à un niveau moyen de 1.03 lièvre observé au km.

Ce constat s'appuie sur l'Unité de Gestion entière, incluant un secteur situé rive droite de la Garonne au niveau de Cazères, qui chute lourdement, faisant baisser l'indice moyen de ce secteur.


Souhaitons que cette baisse soit passagère, les gestionnaires y seront attentifs.

Le **Pays Pyrénées Centrales** n'est pas le plus accueillant pour les populations de lièvres, bien que quelques capucins parcourent les pelouses d'altitude.

L'indice kilométrique qui oscille au fil des ans aux environs de 0,40 lièvre vu par km, a connu une diminution progressive depuis la saison 2017-18. Après l'hiver 2021 où le résultat nul nous faisait craindre sa disparition, l'indice s'est redressé jusqu'à 0.36 l'an dernier. Le comptage de cet hiver, n'a pas confirmé cette tendance, l'IKA enregistré est tombé à 0.14.

Cette valeur reste la plus faible de tous les pays haut-garonnais. En contrepartie, le renard s'est très bien adapté à ce territoire avec un indice de 0.51 renard au km.

Evolution Indice Kilométrique Abondance
Pays Pyrénées Centrales



Renard : progression

Dans le cadre des comptages lièvres, un inventaire de toutes les espèces observées, est réalisé. Le renard fait partie des noctambules et cette méthode de suivi permet d'évaluer l'état de progression de sa population. La courbe ci-dessous nous indique que l'Indice Kilométrique concernant le « goupil » est en progression constante depuis plus de 25 ans. L'animal est un prédateur opportuniste qui, à




l'inverse de ses proies, s'adapte aux modifications du paysage agricole et trouve une ressource alimentaire abondante toute l'année.

Après s'être stabilisé pendant plusieurs années, l'IK renard s'est envolé cet hiver. Nous avons relevé une valeur moyenne de 0.29 renard vu au km parcouru.

Suivant les pays, cette valeur fluctue, de 0.14 à 0.51.

Attention à cette hausse de population de renards qui peut avoir un impact sur la petite faune de plaine.

Superposition IK Lièvre et IK Renard



De plus en plus de chasseurs volontaires pour compter

La commission Petit gibier-migrateurs de la Fédération des Chasseurs 31 a proposé d'adapter les demandes croissantes de comptages aux disponibilités des techniciens de la FDC.

Plus de la moitié des communes de notre département (environ 300) sont prospectées en comptage de nuit. Cela représente plus de 200 opérations réparties sur 3 ans, à raison de 70 comptages par hiver.

Les ACCA qui désirent assurer un suivi annuel de leur population réalisent elles-mêmes cette mission avec le soutien administratif et matériel (phares, gyrophares) de la Fédération. Pendant l'hiver 2025-2026, 68 conventions ont été signées entre les chasseurs et la Fédération. Cela fait un total de 184 communes prospectées.



D.Gest -FNC

Le nombre important de contrats depuis sa mise en place il y a 10 ans, prouve la volonté d'implication des chasseurs dans leur rôle de gestionnaire. Il démontre aussi qu'ils ont adhéré à cette méthode de suivi riche en recueil de données.

Les éléments collectés aident les membres de l'ACCA dans leurs décisions d'orientation des prélèvements sur la population de lièvres (nombre de bracelets de marquage autorisés par chasseur pour la saison suivante).

La Fédération se réjouit que cette méthode de comptage soit appréciée des chasseurs, ce qui prouve sa fiabilité et confirme son utilité.

La FDC souhaite continuer d'apporter son soutien à ces chasseurs gestionnaires.

Comment s'analyse l'état sanitaire de la faune sauvage ?

La Fédération fait procéder à des analyses auprès du Laboratoire Vétérinaire Départemental (LVD31) à Launaguet dès qu'un animal suspect a été prélevé, ou est retrouvé mort. Les éléments qui laissent supposer une éventuelle cause de mortalité autre que naturelle mettent en éveil le chasseur qui en avertit la Fédération.

Après la collecte de l'animal, si l'état permet l'analyse, un technicien va le déposer au laboratoire en y joignant la

fiche SAGIR remplie avec le responsable du territoire.

Ce document stipule principalement la date, le lieu de la découverte de l'animal, et les premiers constats visuels sur l'aspect extérieur du cadavre.

L'analyse est pratiquée dès sa réception au laboratoire. En cas de suspicion d'une maladie, une contre-expertise est demandée auprès d'un second laboratoire. Les résultats sont alors diffusés à la Fédération qui en avertit les adhérents et procède alors à la mise en place d'actions spécifiques.

Grâce à la vigilance des chasseurs, FDC31 et gestionnaires peuvent réagir et prendre les mesures de gestion adéquates.

Les chasseurs doivent informer la Fédération des cas de mortalité importants et si possible apporter les cadavres frais pour une analyse en laboratoire.

Durant la saison 2025-2026, plusieurs chasseurs ont rapportés quelques cas de strongylose pulmonaire disséminés dans le département, sans que l'on puisse craindre une « épidémie ».

Le service Suivi Faune Sauvage de la FDC31 reste attentif à toutes les observations. **Les chasseurs restent un maillon essentiel de veille sanitaire sur les territoires.**

SAGIR : Surveiller pour AGIR

Réseau de surveillance épidémiologique fondé sur le partenariat de l'OFB et des FDC.

Résultats d'analyse

Les animaux analysés ont permis d'établir un constat sur les causes de mortalité les plus fréquentes :

- EBHS
- Tularémie

Ces analyses contribuent à améliorer la veille sanitaire à laquelle les chasseurs participent.



F. Arroyo - FDC31

Fédération des Chasseurs
de la Haute-Garonne

23 chemin de Laveran
CS 90002
31390 CARBONNE

Ces suivis sont co-financés dans
le cadre de l'éco-contribution

